



# پروتکل اختلالات قند خون

مدیریت صحنه

ایمنی - ارزیابی کلی - درخواست منابع

ارزیابی اولیه

Airway - Breathing - Circulation

شرح حال هدفمند - SAMPLE

کنترل علائم حیاتی (BP-O<sub>2</sub>sat-RR-PR-BS-GCS)

BS < 70 mg/dl  
اطفال: BS < 50 mg/dl  
دیابتیک: BS < 90 mg/dl

BS: 70-250 mg/dl  
دیابتیک: 90-250 mg/dl

BS > 250 mg/dl

غیر هوشیار یا  
دیس اورینته

هوشیار، اورینته و  
توانایی در بلع

عدم مداخله درمانی و  
توجه به علائم و  
مشکلات بیمار

تجویز نرمال سالین به مقدار یک  
لیتر در بالغین و 20cc/kg در  
اطفال در عرض یک ساعت

گرفتن راه وریدی  
اوپال گلوکز ۵۰٪ در  
بزرگسالان  
اطفال: 2.5cc/kg از  
محلول ۲۰٪

تجویز گلوکز خوراکی

مراجعه به پروتکل  
مربوط براساس  
شکایت بیمار

\*در صورت وجود شواهد شوک یا  
دهیدراتاسیون یک لیتر سرم  
نرمال سالین در عرض ۲۰ تا ۳۰  
دقیقه انفوزیون گردد.  
\*\* در صورت شک به مشکلات  
قلبی و در افراد بالاتر از ۶۰ سال  
بولوس های 200cc هر ۱۰  
دقیقه با کنترل سمع ریه (جهت  
جلوگیری از ادم ریه) انفوزیون  
شود.

بهبود سطح  
هوشیاری؟

بله

خیر

چک مجدد BS

بررسی سایر علل کاهش هوشیاری

انتقال به مرکز درمانی - پایش مداوم